

Najlepsze odmiany rzepaku ozimego w sezonie 2018



| | CHOPIN F1 <small>NOWOŚĆ</small> | SY FLORIAN F1 <small>NOWOŚĆ</small> | GAROU F1 | DK EXALTE F1 | ACAPULCO F1 | SY ILONA |
|-----------------------------------|---|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Hodowla | Rapool | Syngenta | Rapool | Monsanto | Limagrain | Syngenta |
| Typ odmiany | hybrydowa | hybrydowa | hybrydowa | hybrydowa | hybrydowa | liniowa |
| Plonowanie w 2017 r., % wzorca | 125* | brak danych | 109 | 115 | 120 | 109 |
| Plonowanie w 2016 r., % wzorca | 118* | brak danych | 118 | 118 | 111 | 110 |
| Plonowanie w 2015 r., % wzorca | brak danych | brak danych | 112 | 123 | 125 | 106 |
| Początek kwitnienia | średnio wczesny | średni | średnio wczesny | średnio późny | średnio wczesny | średni |
| Termin dojrzewania | średnio wczesny | średni | średnio wczesny | średni | średnio wczesny | średni |
| Wysokość roślin | średnia | niska | średnia | średniowysoka | wysoka | średnia |
| Zimotrwałość | bardzo dobra | dobra | bardzo dobra | bardzo dobra | średnia | bardzo dobra |
| Zawartość tłuszczu | bardzo wysoka | bardzo wysoka | bardzo wysoka | bardzo wysoka | bardzo wysoka | wysoka |
| Odporność na wyleganie | bardzo dobra | dobra | bardzo dobra | dobra | bardzo dobra | bardzo dobra |
| ZDROWOTNOŚĆ | | | | | | |
| Phoma | brak danych | brak danych | +++ | +++ | +++ | + |
| Zgnilizna twardzikowa | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | +++ |
| Czerń krzyżowych | +++ | ++ | +++ | +++ | +++ | ++ |
| WYMAGANIA AGROTECHNICZNE | | | | | | |
| Zalecany termin wysiewu | wczesny - opóźniony | wczesny - opóźniony | wczesny - opóźniony | optimalny - opóźniony | optimalny - opóźniony | wczesny - optimalny |
| Obsada roślin szt./m ² | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 45-60 |
| Wymagania glebowe | mniejsze/średnie | mniejsze/średnie | mniejsze/średnie | mniejsze/średnie | średnie | mniejsze/średnie |

Opracowano na podstawie wyników COBORU, BSA i informacji hodowców.
 Cecha: + - dobra, ++ - bardzo dobra, +++ - wybitnie dobra, nd - nie dotyczy
 * wynik z badań rejestrowych przeliczony na wzorzec z badań porejestrowych

Najlepsze odmiany rzepaku ozimego w sezonie 2018



| | TROUBADOUR F1 | TRINITY® | MARLEY | PATRON | DA VINCI® |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Hodowla | RAGT | Syngenta | Saatbau | Bayer | Syngenta |
| Typ odmiany | hybrydowa | liniowa | liniowa | liniowa | liniowa |
| Plonowanie w 2017 r., % wzorca | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych |
| Plonowanie w 2016 r., % wzorca | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych |
| Plonowanie w 2015 r., % wzorca | brak danych | brak danych | brak danych | 92 | 98 |
| Początek kwitnienia | bardzo wczesny | bardzo wczesny | średnio wczesny | średnio wczesny | wczesny |
| Termin dojrzewania | bardzo wczesny | wczesny | średnio wczesny | średnio wczesny | średnio wczesny |
| Wysokość roślin | średnia | średnia | niska | wysoka | niska |
| Zimotrwałość | dobra | bardzo dobra | dobra | bardzo dobra | bardzo dobra |
| Zawartość tłuszczu | bardzo wysoka | bardzo wysoka | bardzo wysoka | bardzo wysoka | wysoka |
| Odporność na wyleganie | dobra | bardzo dobra | dobra | bardzo dobra | bardzo dobra |
| ZDROWOTNOŚĆ | | | | | |
| Phoma | + | + | + | ++ | ++ |
| Zgnilizna twardzikowa | +++ | ++ | ++ | ++ | +++ |
| Czerń krzyżowych | ++ | +++ | ++ | ++ | ++ |
| WYMAGANIA AGROTECHNICZNE | | | | | |
| Zalecany termin wysiewu | optimalny, opóźniony | wczesny - lekko opóźniony | wczesny - optimalny | wczesny - optimalny | wczesny - optimalny |
| Obsada roślin szt./m ² | 40-55 | 40-60 | 55-70 | 40-60 | 45-60 |
| Wymagania glebowe | mniejsze/średnie | średnie/większe | średnie | średnie | mniejsze/średnie |

Opracowano na podstawie wyników COBORU, BSA i informacji hodowców.
Cecha: + - dobra, ++ - bardzo dobra, +++ - wybitnie dobra, nd - nie dotyczy